Nombre dérivé

Objectifs :

- Découvrir la notion de taux d'accroissement
- Découvrir la notion de nombre dérivé d'une fonction en un point et savoir la lire sur un graphique, la calculer algébriquement ou en obtenir une valeur approchée à l'aide de l'outil informatique.
- Savoir déterminer l'équation de la tangente en un point à une courbe lorsqu'elle existe
- Savoir tracer une tangente connaissant le nombre dérivé

Aperçu historique :

La notion de nombre dérivé, puis de fonction dérivée sont nées au XVII^e siècle (presque) simultanément chez deux scientifiques **Leibniz** (1646-1716) et **Newton** (1642-1727) à partir de deux problèmes très différents. On a vu dans le chapitre ?? que **Leibniz** avait le premier parlé de fonction numérique. Il s'est aussi intéressé aux courbes représentatives de ces fonctions et en particulier aux droites joignant deux points d'une telle courbe. Les points $A(a; f(a))$ et $M(a+h; f(a+h))$ sont sur la courbe représentative d'une fonction f . Le coefficient directeur de la droite (AM) est $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Qu'advient-il de ce coefficient directeur lorsque les deux points A et M sont très proches l'un de l'autre, "infiniment proches" ?

Newton s'est intéressé aux mouvements et en particulier aux vitesses d'objets en déplacement : à un instant t , un objet a parcouru une distance d_1 , à l'instant $t+h$ ($h > 0$), il a parcouru la distance d_2 . Sa vitesse moyenne entre les instants t et $t+h$ est donc $V_m = \frac{d_2-d_1}{h}$. Que devient cette vitesse lorsque les instants t et $t+h$ sont très proches, "infiniment proches" ?

Dans les deux cas, on est amené à travailler sur des nombres "infiniment proches" et donc à devoir calculer des quotients de nombres "infiniment proches de 0". Pour cela, nous allons définir (dans un premier temps de manière intuitive) la notion de limite qui a posé de nombreux soucis aux mathématiciens d'avant **Newton** et **Leibniz** (voir par exemple les paradoxes de **Zénon d'Alexandrie**).

1. Droite sécante à une courbe

Dans cette partie, f est une fonction numérique définie sur un intervalle I , et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.

a et x sont deux réels distincts dans l'intervalle I privé de ses bornes.

On note h le réel non nul tel que $x = a + h$.

On note A le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse a , et M celui d'abscisse x .

Le coefficient directeur de la droite (AM) est le quotient $t = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

Remarque : Le coefficient directeur de la droite (AM) est aussi appelé **taux de variation** de f entre a et $a+h$.

Exemple : Pour f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$, le coefficient directeur de la droite (AM) (avec les mêmes notations que précédemment) est :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = 2a + h$$

2. Nombre dérivé et interprétation graphique

Soient f une fonction numérique définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Soient a et x deux réels distincts dans l'intervalle I privé de ses bornes. On note h le réel non nul tel que $x = a + h$.

Avec les mêmes notations que précédemment, si le point M se rapproche "infiniment près" du point A , la droite (AM) devient "tangente" à la courbe $\mathcal{C}$ au point A .

Lorsque M se rapproche de A , l'abscisse x se rapproche de a , c'est-à-dire que $x - a$ se rapproche de 0, c'est-à-dire que $h = x - a$ se rapproche de 0.

On dit que h **tend vers** 0, ce qui signifie que h se rapproche *infiniment près* de 0.

On note $h \rightarrow 0$.

On va s'intéresser à ce que devient le *taux de variation* $t = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ (c'est la pente de la droite (AM)) lorsque $h \rightarrow 0$: ce sera la pente de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A .

On appelle cette pente la "**limite de t lorsque h tend vers 0**", et on la note :

$$\lim_{h \rightarrow 0} t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

A. Nombre dérivé

Définition 7.1 Lorsque h se rapproche de plus en plus de 0 (i.e. quand x se rapproche de a), si le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ devient de plus en plus proche d'un certain nombre réel l , on dit que la limite quand h tend vers 0 de ce quotient vaut l .

Dans ce cas on dit que f est dérivable en a et cette limite est appelée nombre dérivé de f en a .

On note :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = l$$

On verra ci-après que le nombre dérivé de f en a est la pente de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a , et ce nombre dérivé se note $f'(a)$.

Exemple :

En reprenant la fonction carré et le résultat obtenu dans l'exemple précédent on a :

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = 2a + h.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, on a $2a + h \rightarrow 2a + 0$, c'est-à-dire que $2a + h \rightarrow 2a$.

Ainsi,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a$$

donc f est dérivable en a et on a $f'(a) = 2a$.

B. Interprétation graphique

Lorsque h se rapproche de 0, le point M se rapproche de A , et la droite (AM) se rapproche d'une "position limite" appelée **tangente** à $\mathcal{C}$ au point A ; son coefficient directeur est alors $f'(a)$.

Exemple : Dans l'exemple précédent, au point d'abscisse a , la *pente de la tangente* à la courbe représentative de la fonction carré est $2a$.

Propriété 7.1 Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I et dérivable en $a \in I$. La tangente T_a à la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation :

$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Démonstration La fonction f est dérivable donc la tangente T_a admet un coefficient directeur qui est $f'(a)$. Son équation est donc du type $y = f'(a)x + p$ (*).
 De plus, $A(a; f(a)) \in T_a$ donc ses coordonnées vérifient l'équation de T_a , et il vient : $f(a) = f'(a) \times a + p$.
 Par suite, $p = f(a) - a \times f'(a)$.
 En remplaçant dans l'équation (*) on obtient : $y = f'(a)x + f(a) - a \times f'(a)$, et donc
 $T_a | y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

C. Interprétation cinématique

On considère un objet en mouvement.

On note t la durée en secondes de son parcours, et $y(t)$ la distance en mètres, parcourue après t secondes. Comme la vitesse moyenne est $V_m = \frac{\text{distance}}{\text{temps}}$, si on note t_1 et t_2 deux instants, la distance parcourue entre t_1 et t_2 est $t_2 - t_1$, et le temps de parcours de cette distance est $y(t_2) - y(t_1)$. Donc le quotient $\frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1}$ est la vitesse moyenne de l'objet entre les instants t_1 et t_2 . On s'intéresse à ce que devient cette vitesse lorsque les instants t_1 et t_1 deviennent "infiniment proches".

Définition 7.2 :

Dans les conditions précédentes, la limite de la vitesse moyenne quand t_2 se rapproche de t_1 (c'est à dire le nombre dérivé de y en t_1) est appelée vitesse instantanée de l'objet à l'instant t_1 .

$$V(t_1) = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t_1 + h) - y(t_1)}{h}$$

Exemple :

On lâche un objet en chute libre. On note $x(t)$ la distance parcourue (en m) après t secondes.

On admet ⁽¹⁾ que la distance parcourue s'exprime en fonction du temps de parcours par $x(t) = 4,9t^2$.

Calculer la vitesse instantanée de l'objet après une chute de t secondes.

On exprime la vitesse moyenne de l'objet entre les instants t et $t + h$:

$$v = \frac{x(t+h) - x(t)}{h} = \frac{4,9(t+h)^2 - 4,9t^2}{h}$$

En développant, réduisant et simplifiant, on obtient :

$$v = \frac{4,9(t^2 + 2th + h^2) - 4,9t^2}{h} = \frac{9,8th + 4,9h^2}{h} = 9,8t + 4,9h$$

Lorsque h tend vers 0, ce quotient se rapproche de $9,8t$: on a $\lim_{h \rightarrow 0} (9,8t + 4,9h) = 9,8t$.

Donc la vitesse instantanée de l'objet en chute libre est donnée par l'expression $v(t) = x'(t) = 9,8t$.

Après 5 secondes de chute libre, la vitesse est de $9,8 \times 5 = 49$ m/s. (soit 179,4 km/h).

⁽¹⁾Distance parcourue en chute libre : $d = \frac{1}{2}gt^2$, où $g \simeq 9,80665 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur. On remarque que la vitesse de chute libre est indépendante de la masse de l'objet.